

DuPont™ Debut®

control de malas hierbas

Ingrediente activo	metil triflurosulfurón 50%
Familia química	sulfonilureas Grupo HRAC B
Formulación	microgránulo dispersable (WG)
Envases	bote de 120 gramos

Número de registro : 19963

Puede acceder a todos los documentos de registro de los productos fitosanitarios a través de la web del MAGRAMA (<http://origin.magrama.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/productos-fitosanitarios/fitos.asp>)

Plazo de seguridad

No procede

Características:

- Debut® es una solución herbicida que tiene el uso autorizado en el cultivo de la remolacha para el control de malas hierbas de hoja ancha en postemergencia del cultivo y de las malas hierbas.
 - Debut® se puede aplicar desde cotiledones hasta el cierre de líneas de la remolacha.
 - Debut® tiene acción foliar y radicular, deteniendo el crecimiento de las malas hierbas tras la aplicación. Los síntomas, coloración anómala, enanismo y muerte de las hierbas se producen al cabo de 1 a 3 semanas.
 - Dos aplicaciones sucesivas de Debut® (5-8 días) controlan la mayoría de las malas hierbas de hoja ancha, incluso las consideradas difíciles (*Salsola kali*, *Polygonum aviculare*, *Kochia scoparia*, ...)
 - Cualquier cultivo puede sembrarse tras una remolacha tratada con Debut® siempre que se respeten los intervalos normales entre cultivos.
- **Observaciones**
 - Debut® es compatible con la mayoría de los productos usados en remolacha, incluidos los antigramíneos.
 - Evitar tratar remolacha sometida a una situación de estrés (falta o exceso de agua, temperaturas extremas,...)
 - Debut® no es volátil. No tratar en días de viento para evitar que la deriva alcance a cultivos vecinos sensibles

DuPont™ Debut®

control de malas hierbas

Aplicaciones autorizadas y dosis :

Cultivo	Malas hierbas	Dosis gr/hectárea	Momento de aplicación y observaciones
Remolacha	Son sensibles: <i>Amaranthus,</i> <i>Anagallis,</i> <i>Datura,</i> <i>Diplotaxis,</i> <i>Galium,</i> <i>Helianthus,</i> <i>Kochia,</i> <i>Lamium,</i> <i>Polygonum,</i> <i>Raphanus,</i> <i>Salsola,</i> <i>Sinapis,</i> <i>Sonchus,</i> <i>Veronica</i>	30-60	<p>Dosis bajas: hierbas en cotiledones- 2 hojas verdaderas, cuando se realicen 2 aplicaciones</p> <p>Dosis altas: hierbas en 2-4 hojas o si existe <i>Salsola</i> o <i>Polygonum</i></p> <p>Es necesario la adición de un adyuvante a la dosis recomendada por el fabricante</p> <p>Temperatura óptima de aplicación: 15-25° C</p>