

# DuPont™ Glean® 75 PX

control de malas hierbas

<b>Ingrediente activo</b>	clorsulfurón 75 %
<b>Familia química</b>	sulfonilureas Grupo HRAC B
<b>Formulación</b>	pasta extrudada (PX)
<b>Envases</b>	100 g

## Número de registro : ES 00021

Puede acceder a todos los documentos de registro de los productos fitosanitarios a través de la web del MAGRAMA (<http://origin.magrama.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/productos-fitosanitarios/fitos.asp>)

### Plazo de seguridad

NO procede

### Características:

- Glean® 75 PX es una solución herbicida autorizada en trigo, cebada y avena para el control de un amplio número de malas hierbas de hoja ancha y vallico (*Lolium spp*). Para controlar *Lolium spp* utilizar Glean® 75 PX en preemergencia en trigo o bien en postemergencia del cereal antes de que la mala hierba alcance el tamaño de 3 hojas.
- Glean® 75 PX es de uso flexible pudiendo aplicarse en pre-emergencia del trigo y en postemergencia del trigo, cebada y avena desde que el cereal tenga 3 hojas hasta el principio del encañado.
- Glean® 75 PX es selectivo del cereal en cualquier condición climática y tipo de suelo
- Glean® 75 PX tiene acción foliar y radicular, deteniendo el crecimiento de las malas hierbas en el momento de la aplicación. Los síntomas, coloración anómala, enanismo y muerte de las hierbas se manifiestan al cabo de 1 a 3 semanas.
- Glean® 75 PX debe usarse solamente en rotaciones de cereal con o sin barbecho: al año siguiente a la aplicación solo podrá cultivarse cereal

# DuPont™ Glean® 75 PX

## control de malas hierbas

### Observaciones

- Glean® 75 PX es compatible su mezcla en tanque con la mayoría de los herbicidas usados en cereal.
- Glean® 75 PX no es volátil. No tratar en días de viento para evitar que la deriva alcance a cultivos vecinos sensibles.
- Utilizar equipos de baja presión y volumen de agua de 100 a 400 l/ha.
- Después de utilizar Glean® 75 PX debe limpiarse correctamente el equipo de aplicación

### Aplicaciones autorizadas y dosis :

Cultivo	Malas hierbas	Dosis	Momento de aplicación y observaciones
Trigo	<i>Lolium spp</i> (vallico) y malas hierbas de hoja ancha	14-20 g/hectárea	<p><b>Pre-emergencia:</b> aplicar inmediatamente después de la siembra para el control de vallico y hoja ancha</p> <p>Suelos ligeros: 14 g/ha.</p> <p>Suelos arcillosos: 20 g/ha</p>
Trigo, cebada y avena			<p><b>Post-emergencia:</b> aplicar desde que el cereal tenga 3 hojas hasta el comienzo del encañado.</p> <p>Debe de añadirse un adyuvante a la dosis que recomiende el fabricante</p> <p>Suelos ligeros: 14 g/ha.</p> <p>Suelos arcillosos: 20 g/ha</p>